

ปรับกฎของการกลับสู่การใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิม ระยะที่1

(11.1~) ติดตามผล (11.29~)

ปรับกฎของการกลับสู่การใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิม ครั้งที่2

ถูกชะลอออกไปเนื่องจากแนวโน้มของการแพร่ระบาด
และมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้น เป็นต้น

- ส่งเสริมแผนการรับมือติดตาม ผลทางการแพทย์ โดยการรักษาระดับ
มาตรการกักกัน ซึ่งในปัจจุบันที่เริ่มใช้มาแล้ว เป็นเวลา 4สัปดาห์ จนกว่าจะได้รับการ
ฉีดวัคซีนกระตุ้นและมีผลในการป้องกัน

เปลี่ยนแปลงเป็นการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

- ระบบการรักษา ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล มีข้อยกเว้น
เฉพาะผู้ที่ไม่สามารถรับการรักษาที่บ้านได้เท่านั้น

< เดิม >	< ปรับปรุง >
<p>◦(กลุ่มเป้าหมาย) ผู้ที่ไม่มีความจำเป็น ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ที่มียุ่อย่างน้อยกว่า 70ปี เป็นผู้ที่ไม่มีอาการ, มีอาการไม่รุนแรง,เป็นผู้ที่ สมัครใจที่จะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน</p> <p>◦(เหตุผลในการยกเว้น) ผู้ที่อยู่อาศัยในแวลล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ที่มีอายุเกิน 60ปี มีผู้ที่ อยู่อาศัยร่วมกัน มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล</p>	<p>◦(กลุ่มเป้าหมาย) ผู้ที่ได้รับการยืนยัน ติดเชื้อโคโรนา 19 แต่ยกเว้น ผู้ที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, ผู้ที่อยู่อาศัยในแวลล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ ป่วยที่จำเป็นต้อง ดูแล ที่ไม่มีผู้ดูแล(เด็ก,ผู้พิการ,ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน อายุ 70ปี ขึ้นไป</p>

ชี้สายด้วยให้คำปรึกษา ด้านการรักษาฉุกเฉิน ตลอด 24ชั่วโมง และจัดเตรียม
หน่วยช่วยเหลือทางการแพทย์, เคลื่อนย้ายไว้คอยช่วยเหลือล่วงหน้า

กระตุ้นให้ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน รับการฉีดวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนกระตุ้น(บูสเตอร์ช็อต) แทนที่
กระตุ้นให้ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐาน

- เริ่มเปิดคิวจองล่วงหน้าสำหรับเด็กและวัยรุ่น (อายุ 12-17ปี)(~'22.01.22.)

จัดให้มีการฉีดวัคซีน ด้วยการเชื่อมโยง ผ่านโรงเรียน-สถานที่ฉีดวัคซีน
ตามสภาพของแต่ละพื้นที่(จัดโดยสำนักงานการศึกษา)

- ร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาอื่นๆ ที่ไปยัง
สถาบันทางการแพทย์

' เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนบูสเตอร์

- ในเดือน ธันวาคม เน้นฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป),

เร่งรัดฉีดวันต่อวัน ได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เหมือนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

- ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18ปีขึ้นไป ที่ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานครบแล้ว หลังฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐาน
5เดือน (150วัน)

- มีบัตรผ่านการกักกัน(ใบรับรองการฉีดวัคซีน) กำหนดระยะเวลาหมดอายุ (6เดือน)

จำเป็นต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์ภายใน 6 เดือน

- ผู้ที่มีเหตุจำเป็นส่วนบุคคล (รักษาโรค, เดินทางออกนอกประเทศ อื่นๆ), ฉีดวัคซีนเป็นกลุ่ม
(สถาบันทางการแพทย์, สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ)

และสาเหตุอื่นๆ ผู้ที่ต้องการรับฉีดวัคซีนที่เคลื่อนตามเกณฑ์ การฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

* สามารถรอรับวัคซีนได้ภายใน 1 เดือน

* (ฉีดวัคซีน ขั้นพื้นฐานครบ 4 เดือน) 60ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว, สถาบันทางการแพทย์,

สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

(ฉีดวัคซีน ชั้นพื้นฐานครบ 5 เดือน) 18-49ปี, วัย 50

(ฉีดวัคซีน ชั้นพื้นฐานครบ 2 เดือน) ผู้ที่ฉีดวัคซีนจอห์นสัน, ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ

เพิ่มความเข้มงวดมาตรการกักกัน

◦เสริมกำลังในการทดสอบ PCR* ในโรงพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ สถานอำนวยความสะดวกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ สำหรับผู้ที่รับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมครบแล้ว (บูสเตอร์ช็อต)

* (มาตรฐานเดิม) ทดสอบ PCR 1 ครั้ง (เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)+ รอห้องแยกกักตัว 1 วัน

→ (เปลี่ยนแปลง) ทดสอบ PCR 2 ครั้ง (① เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, วันที่ 3 ของการกักกัน)+

รอในห้องกักกัน 4 วัน

- ห้ามจัด กิจกรรม ทำกิจกรรม จักจี้ดูหน้า ในสถานสงเคราะห์สำหรับผู้สูงวัย (ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น)

<แปลโดยศูนย์โทรศัพท์ทนาย 1577-1366>